Cancer du Sein : modifier le risque hormonal endogène ?

Jean Levêque

Service de Gynécologie CHU Anne de Bretagne

Dpt d'Oncologie Chirurgicale CRLCC Eugène Marquis

RENNES

Pourquoi cette question ?

Conjonction de :

- changement du mode de vie
- impression d'épidémie

Survenue :

- chez la femme
- vers 40-60 ans

En cause : les estrogènes...

Facteur	Risque Relatif
Age > 60 ans	>10
Vie « occidentale »	> 5
PR < 11 ans	3
M > 54 ans	2
PGAT > 40 ans / absence allaitement	3
ATCD Fam 1 ^{er} degré	2
Mastopathie à risque	4
Régime gras	1.5
BMI < 35 pré-Ménopause	0.7
BMI > 35 Ménopause	2
Alcool	1.3
OC's utilisatrices	1.24
HRT > 5 ans	1.35

Comment : *Vie Intra-Utérine*¹

→ Taux d'estrogènes circulants

Facteur	RR (95% IC)
Poids Naissance > 4000g	1.15 (1.09-1.21)
Mère > 30 ans	1.13 (1.02-1.25)
Cholestase G.	2.16 (1.27-3.67)
Eclampsie	0.48 (0.30-0.78)
G. Multiples / Prématurité	0.93 (0.87-1.00)

Comment : *Vie Intra-Utérine*²

Plasticité des gènes de développement

- En période **péri-conceptionnelle**
- Impact sur les cell souches
 - quantitatif
 - qualitatif

➔ **INFORMER & EDUQUER**

Comment : *Vie Reproductive*

Facteur	Risque Absolu	Mécanisme : Estrogènes
Ménarches précoces < 12 vs > 14 y	- 5 à 10%	<ul style="list-style-type: none">• durée & période d'exposition• taux d'E2 plus élevés
Retard Ménopause Ménopause < 40 ans	+ 3% / an - 50%	<ul style="list-style-type: none">• durée d'exposition• balance prolifération / réceptivité
Age jeune PGAT < 20 vs > 35 y	Delta = 40%	<ul style="list-style-type: none">• différenciation des cell souches
Multiparité < 30 y vs 0-pare	- 7% par G. - 25%	<ul style="list-style-type: none">• taux d'E2 élevés• différenciation des cell souches
Allaitement maternel	- 4.3% si > 1 y	<ul style="list-style-type: none">• décalage de l'ovulation• taux d'E2 plus faibles si All Mat• différenciation des cell souches• baisse d'acidité du lait maternel

Comment : *le poids*¹

- Surcharge pondérale androïde
Androgènes → Aromatase → Estrogènes
- 2 études d'observation concordantes :

	EPIC	Nurse Health Study
Prise de poids	+ 8% par + 5 kg en post-ménopause	+ 45% par 25 kg depuis âge de 18 y
Perte de poids		- 57% par – 10 kg

Comment : *le poids*²

- WHI Randomized Controlled Dietary Modification Trial
- Méthodologie :
 - quantitative : réduction énergétique : - 20%
 - qualitative : fruits > 5 / j et légumes > 6 / j
- Résultats : à 8.1 y
 - **HR = 0.91** (0.83 – 1.01)
 - impact possible
 - chez patientes en **excès pondéral**
 - sur les tumeurs **ER+**

Comment : *l'activité physique*

- **EPIC :**

- effet dose
- > 5 heures de sport / sem → **HR = 0.62** (0.49-0.78)
- surtout si F. en surpoids et nullipares

- **WHI :**

- effet temps : début à 35 y → **HR = 0.86** (0.78-0.95)
- effet dose : 2h30 de sport → **HR = 0.82** (0.68-0.97)

Donc : *notre mode de vie change*

- **Alimentation**

- quantitativement : plus de calories
- déséquilibre qualitatif :
 - Graisses / Sucres Lents
 - protéines animales / fruits légumes
 - apports nutritionnels modifiés chez le jeune enfant

- **Vie reproductive**

- PGAT : 30 ans en France
- vie génitale plus longue
- allaitement maternel court

- **Sédentarité**

Peut-on y remédier ?

- **Mimer l'état de grossesse** : injections d'HCG...
- **Equilibre hormonal** profitable :
 - au foetus *in utero* :
 - *rôle clé de la période péri-conceptionnelle*
 - à la Femme en période de péri-ménopause
- **Recommandations ANAES** :
 - ½ heure d'exercice par jour
 - 5 fruits et légumes par jour

Yes, We Can...