

ENQUETE SUR LA GESTION DU TRAITEMENT DES CANCER DE SEIN LOCALEMENT AVANCE AU MAROC

F.Mamouch^{1'2}, N.Berrada¹, H.Errihani ^{1'2}

¹Institut national d'Oncologie sidi Mohamed ben Abdallah. Rabat, Maroc

²Université Mohammed V Rabat, Maroc

Contexte:

Au Maroc la gestion du traitement des cancers du sein localement avancé fait intervenir plusieurs spécialités. La prise en charge dépend de plusieurs facteurs : le cliniciens ; le secteur (public contre privé) et la disponibilité du traitement. Les données récentes publiées en Europe et aux USA suggère qu'il ya des différence entre les lignes directrices et la pratique réel sur le train dans le monde, mais aussi entre les régions (USA contre Europe).

Objectif

Le but de notre étude porte sur la description de la situation actuelle des pratique thérapeutique des cancers du sein localement avancé au Maroc .

Matériel et Méthodes


Enquête avec 75 cliniciens (oncologues/ radiothérapeutes) sur la pratique thérapeutique dans le terrain afin de connaitre et serrer les éléments prises en considération dans les traitements des cancers du sein localement avancé.

Conclusion :

les résultats préliminaires nous fournissent des informations sur la gestion des cancers sein localement avancé au Maroc. Ils sont semblables à la littérature. Nous allons poursuivre cette enquête pour inclure plus de médecin pour obtenir des données réelles sur la situation de notre pays.

Résultats:

Âge des médecins: 36% âgés moins de 35 ans et 48% âgés de 35 à 45ans.



- 92% des médecins ont déclaré que la définition de la crise viscérale n'est pas clair
- 20% des médecins utilisent des lignes directrices européennes dans la définition de sensibilité endocrine
- 21% as the association of visceral metastases + biological abnormalities.

la présence des métastases viscérales (indépendamment de la crise viscérale) est considéré comme indication de la chimiothérapie pour les patientes ER + / HER2-par 54%

