

CANCER DU SEIN ET GROSSESSE À LA MATERNITÉ DU CHU ORAN:

A propos d'un cas



BREAST CANCER AND PREGNANCY AT MATERNITY OF ORAN CHU: about one case

H. MOULAY⁽¹⁾; C. ZAOUI^(2,3); T.SAHRAOUI ⁽³⁾; H. BOURROUBEY⁽¹⁾ moulaysky2@yahoo.fr

- 1. Service de Maternité CHU Oran.
- 2. Département de Pharmacie, Faculté de Médecine, Université AHMED BENBELLA ORAN1.
- 3. Laboratoire de Biologie du Développement et de la Différenciation (LBDD). Fac.des Sciences de la nature et la vie,


Département de Biologie AHMED BENBELLA Université ORAN1

INTRODUCTION

L'association cancer du sein et grossesse signifie son diagnostic pendant la grossesse et un an après l'accouchement. Son incidence est estimée à 0,2 % - 3,8 %. Le diagnostic clinique est difficile lors de la grossesse ou de l'allaitement et est donc souvent tardif avec des délais de diagnostic qui varient de 2 à 15 mois[1]. La gravité est liée à la fréquence des formes évoluées inflammatoires mettant en jeu le pronostic maternel et fœtal. Le traitement du cancer du sein associé à la grossesse doit être le plus proche possible de celui réalisé en dehors de la grossesse [2].

Objectiff

Reporter un cas de cancer du sein 🗸 Examen clinique diagnostiqué durant la grossesse traité à la 🗸 Echographie mammaire maternité du CHUO.



Sein Droit :QSI



opacité dense à contours irréguliers



Résultats


- ✓ Patiente âgée de 28 ans
- ✓ Retard de diagnostic de 4 mois
- ✓Grossesse de 28 SA
- ✓ Fœtus à la limite de la viabilité
- ✓ Sein droit; QSI avec rétraction cutanée
- ✓ Tumeur classée:
 - -T3 N1 Mx
 - -ACR5
 - pT2 pN2
 - CCI avec emboles vasculaires
 - SBRIII
 - Tumeur triple négative avec Ki67> 14%

né n'a pas présenté Mastectomie d'anomalies hématologiques à la naissance.


Radiothérapie

Diagnostic


- **✓** Cytoponction
- ✓ Microbiopsie avec recherche des RH, HER2 et Ki67



Lésion à contour étoilé



CCI polymorphe **SBR III**



Idées reçues


Novembre 2017

du sein: mythes


Emboles vasculaires



Ganglions aspect macroscopique



RH-



HER2-: Score 1

Prise em charge

- ✓ Prise en charge multidisciplinaire
- **√** Chimiothérapie néo-adjuvante
- ✓ Interruption de grossesse:

Césarienne à 35 A

Comellusion

- La prise en charge de cette association génère un conflit d'intérêt entre le cancer du sein et la vie intra-utérine.
- ·Une parfaite collaboration entre gynécologue obstétriciens, cancérologues, néonatologistes et psychologues, devrait pouvoir diminuer l'angoisse de la patiente et favoriser une prise en charge optimale qui doit être décidées au cas par cas.
- Respect du souhait de la mère et du couple en parfaite connaissance des risques.