

Description des facteurs de risque du cancer du sein féminin

Etude régionale 2012-2014; Résultats préliminaires

Description of the risk factors for female breast cancer

Regional survey 2012-2014 Preliminary results

K.Terki¹- L.Hennaoui²-N.Chabni²- K.Meguenni²- N.Midoun¹

1 : SEMEP EHU Oran 2 :SEMEP CHU Tlemcen

OBJECTIF

Décrire les différents facteurs de risque du cancer du sein chez la population féminine de l'ouest algérien.

MÉTHODE DE TRAVAIL

- Etude descriptive
- Population cible : femmes présentant un cancer du sein confirmé.
- Recueil exhaustif, concernant toute la région ouest
- Moyen de recueil des données: questionnaire avec des variables en fonction des facteurs de risques constitutifs²des individus (âge, antécédents personnels et familiaux et de prédispositions génétiques au cancer du sein).

Enregistrement et analyse: Epi-info6


DISCUSSION

575 cas colligés.343 fiches traitées vu la qualité des données. Tous les facteurs de risque on été étudiés. Les patientes sont jeunes dont le mode est à 47ans et 25% des cas ont un âge inférieur à 42 ans. La prédisposition génétique, qui reste à vérifier, est à 8,2% ce qui rejoint la littérature. La plupart sont mariés et la notion du célibat ne représente que les 9%. Le niveau d'instruction supérieur n'est retrouvé que dans les 9% des cas. Ce sont surtout des femmes analphabètes ou d'un niveau bas qui développent le cancer contrairement à ce qui est cité par la littérature et retrouvé chez la femme occidentale.

RÉSULTATS

Répartition des cas selon la wilaya de résidence

Etude régionale 2012-2014



Description des facteurs de risque

Facteur étudié	Fréquence (%)
Age	Etendue: 19-85ans AM=51,1±1,2 Mode=47 ans Médiane=50 ans Centile 25=43 ans
Statut matrimonial	Mariés: 74,7 Céliataires: 10,8 AM=20,3 ±0,5
ATCDS de traumatisme du sein	1,4
ATCDS d'infections du sein	1,9
ATCDS P TBS	2,1
ATCDS F TBS	2,3
ATCDS F TMCS	8,1
ATCDS cancer famille	10,1
Ménarche	AM=13,9±0,19 ans
Contraception	54,4 Orale: 74%
Age première grossesse	AM=21,7±0,54 ans
Ménopause	54 AM=48±1,8ans
Allaitement	76,6 Durée moyenne=10 ±0,8mois

ACDS P/ F TBS/M: antécédents personnels ou familiaux de tumeur bénigne ou maligne du sein

CONCLUSION

En comparaison avec d'autres travaux similaires, certains résultats semblent rejoindre la littérature³. Un échantillon plus important voire des études analytiques de type cas-témoins, avec une information complète, permettent d'identifier les différents facteurs de risque et leur association avec la survenue de la maladie ce qui nous permettra d'identifier les facteurs de notre population et dégager des mesures de prévention.

REFERENCES

1. André Nkondjock et Parviz Ghadirian: Facteurs de risque du cancer du sein; Med Sci (Paris) 2005 ; Volume 21, Number 2, Février 2005 : pages 175-180
2. T. Chevallier et al: Méthodologie de l'enquête MISSION (Ménopause, risque de cancer du sein, morbidité et prévalence); Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction-Volume 34, Issue7, Part 1, Novembre 2005, Pages 658-665
3. F. Ammour- Z. Fouatih- LMokhtari: Registre du cancer d'Oran : seize années d'enregistrement- Revue de santé publique, volume 62, supplément, septembre 2014, Page S213