

Caractéristiques épidémiologiques, connaissances et attitudes des femmes face au diagnostic du cancer du sein.

Etude épidémiologique 2015-2016 EHU Oran

Epidemiological characteristics, knowledge and attitude of women to the diagnosis of breast cancer.

Epidemiological study 2015-2016 EHU Oran

Terki K¹., Messid Bouziane H²., Midoun N¹.

1 : Service d'Epidémiologie et de Médecine Préventive EHU d'Oran

2 : Service d'Epidémiologie et de Médecine Préventive CHU d'Oran

INTRODUCTION

Les registres du cancer en Algérie classent la maladie au premier rang chez la femme avec un stade de diagnostic souvent, avancé. Le but de ce travail est de mettre l'accent sur les comportements et les attitudes des femmes face au diagnostic du cancer Oran.

OBJECTIF

Décrire les pratiques, les connaissances et les attitudes des femmes face au diagnostic du cancer du sein

MÉTHODE DE TRAVAIL

Etude CAP, réalisée auprès des femmes atteintes d'un cancer du sein confirmé. Un questionnaire complété par un médecin résident via un interrogatoire des malades. Le traitement de l'information: le logiciel Epi-info6

RESULTATS

CARACTÉRISTIQUES SOCIO-CULTURELLES		
Cas interrogés=120		
Caractéristiques personnelles	Age moyen	47,7±2 ans
	Etendue	26-80
	Médiane	47 ans
Situation matrimoniale	Mariées	89 cas (68%)
	Célibataires	17 cas (13%)
Niveau d'instruction	Analphabètes ou primaire	81 cas(66,4 %)
	Supérieur	1 cas (0,8%)
Niveau socio-économique	Moyen	89 cas (77,4%)
Lieu de résidence	Urbain	44 cas (51,2%)
	Rural	42 cas(48,8%)

CONNAISSANCES ET ATTITUDES	Oui (%)	Non (%)	Sans avis (%)
Manque d'informations sur la maladie	58,8	32,1	9,2
Absence de symptomatologie	32	68	/
Peur de la mort	28	64	8
Peur de la mastectomie	48,8	40,7	10,5
Peur des conséquences sociales	11,6	20,9	11,6
Peur des effets de la chimiothérapie	22,1	59,3	18,6
Ignorance des chances de guérison	38,9	51,1	9,9
Incompétence médicale	19,8	58,1	22,1
Recours à la médecine traditionnelle	71,7	27,5	/

DISCUSSION

la moitié des femmes interrogées sot âgées de moins de 47ans et le ¼ inférieur à 40 ans. Le cancer du sein survient chez les femmes jeunes. Le diagnostic à un stade développé de la tumeur parait dominer, dont les causes sont marquées par la méconnaissance des signes révélateurs du cancer ainsi que l'absence de symptomatologie désagréable. Le manque d'information sur la maladie est incriminé: La peur d'être abandonnée par la famille et la peur des conséquences sociales comme le divorce. L'habitat semble présenter un frein pour un diagnostic précoce de la maladie. Nos résultats rejoignent celles décrites dans plusieurs publications, surtout sur des populations maghrébines et africaines [2-3].

CONCLUSION

Les résultats soulignent la nécessité de renforcer l'information, la sensibilisation et l'éducation de la population concernant les facteurs de risque du cancer du sein, surtout sur les signes d'appel et les moyens de dépistage disponibles. Il serait nécessaire de vulgariser les différents tableaux cliniques, l'évolution de la pathologie et surtout l'intérêt de la prévention.

RÉFÉRENCES

1. F.Ammour, Z.Fouatih, L Mokhtari Registre du cancer d'Oran : seize années d'enregistrement.Revue de santé publique, volume 62, supplément, septembre 2014,PageS213.
- 2.MansourNjah, Radhia Hergli, Jalel Gloulou, Slim Ben Ahmed,Moncef Marzouki:Connaissances, attitudes et comportements des femmes tunisiennes à propos des cancers; gynécologiques: International Journal of Public Health: September 1994, Volume 39, pp 280–286.
3. Nada Bennani Mechita, Mohammed AdnaneTazi, AbdelouahedEr-Raki, Mustapha Mrabet, Asma Saadi, Nouredine Benjaafarr, et Rachid Razine;Survie au cancer du sein à Rabat (Maroc) 2005-2008.International Journal of Public Health: September 1994, Volume 39, Issue 5, pp 280–286