



Sollicitations non programmées auprès des infirmiers de coordination (IDECs) lors d'une prise en charge d'un cancer du sein localisé traité par chimiothérapie : quelles patientes, à quel moment et pourquoi ?

P. Fleury, V. Blazewski, O. Rigal, J. Lequesne, F. Clatot

Centre Henri Becquerel, Rouen

Contact : patricia.fleury@chb.unicancer.fr

Introduction

Les IDECs réalisent 4 entretiens systématiques au cours du parcours de soins : avant et à mi-parcours de la chimiothérapie, avant la radiothérapie et en début de phase de surveillance. Le but de cette étude était d'identifier quelles patientes sollicitent de façon non programmée les IDECs, à quel moment de leur prise en charge, et pour quel motif.

Méthodes

Etude monocentrique, rétrospective, auprès de patientes traitées par chimiothérapie pour un cancer du sein localisé. Recueil de l'ensemble des sollicitations non programmées entre le diagnostic et la fin de la radiothérapie. Interventions classées en 4 catégories : conseils (administratifs, parcours de soins...), problèmes médicaux non spécifiques (thrombose, fièvre...), effets secondaires liés à la chimiothérapie et soutien psychologique.

Résultats

267 patientes incluses, 141 (52,8%) ont appelé au moins une fois et 57 (21,3%) au moins 3 fois. Le nombre total d'appels était de 369.

Caractéristiques des patientes			
	Appel (n=141)	Pas d'appel (n=126)	p
Age (années)	N(%)	N (%)	
≤ 50	39 (27.7%)	34 (27%)	0.71
]50-65]	70 (49.6%)	58 (46%)	
> 65	32 (22.7%)	34 (27%)	
IMC (kg.m⁻²)			
≤ 25	69 (48.9%)	56 (44.8%)	0.58
> 25	72 (51.1%)	69 (55.2%)	
Anxiolytiques			
Oui	39 (27.7%)	21 (16.8%)	0.049
Non	102 (72.3%)	104 (83.2%)	
Anti-dépresseurs			
Oui	18 (12.9%)	15 (11.9%)	0.96
Non	122 (87.1%)	111 (88.1%)	
Vit seule			
Oui	25 (17.7%)	19 (15.1%)	0.68
Non	116 (82.3%)	107 (84.9%)	


Description des appels	
Nombre d'appels	Médiane [min-max]
369 pour 141 patientes	2 [1-17]
Répartition des appels	n (%)
Avant début chimio	32 (8.7%)
Durant le FEC	125 (33.9%)
Durant le TXT	164 (44.4%)
Durant RTE, Herceptin ou TC*	48 (13%)
Motif des appels	n (%)
Conseils	93 (25.2%)
Effets sec. chimiothérapie	94 (25.5%)
Problème médical	122 (33.1%)
Soutien	60 (16.3%)

*TC: TXT/Cyclophosphamide

Comparaison des motifs d'appel en fonction de la CT			
	FEC	TXT	p
Effets sec.			
Oui	20 (16%)	68 (41.5%)	<0.001
Non	105 (84%)	96 (59.5%)	
Pb médical			
Oui	60 (48%)	42 (25.6%)	<0.001
Non	65 (52%)	122 (74.4%)	

Répartition globale des appels en cours de traitement (n=369)

Motif ■ Conseils ■ Effets secondaires ■ Problème médical ■ Soutien



Conclusion

Malgré l'accompagnement planifié, les sollicitations non programmées sont fréquentes. La prise d'un traitement anxiolytique était significativement associée à un nombre accru d'appel. Près de 80% des appels ont eu lieu pendant la chimiothérapie, pour problème médical sous FEC et pour des effets secondaires liés au Taxotère (post C1).