Société Française de Sénologie
et de Pathologie Mammaire

Chimiothérapie néoadjuvante des cancers du sein dans un but de conservation mammaire : expérience de l'Institut Claudius Regaud

Chanel L.¹, Gangloff D.^{1,2}, Garrido I.^{1,2}, Filleron T.², Dalenc F.²

(1) Service de chirurgie plastique, de reconstruction et des Brûlés; CHU Rangueil Toulouse

(2) Institut Universitaire du Cancer Oncopole Toulouse

ONCOPOLE
TOULOUSE | FRANCE

RCP

Oui

**Tentative de conservation?
Rapport Tt/Ts**

Non

Microcalcifications?
Multicentricité?

Bilan Radio Séno:
Mammo/Echo
IRM
Coil

Oui

Non

Indication de chimiothérapie en
adjuvant ?

Oui

Non

Chimiothérapie néoadjuvante

Etude	Nbr	Suivi (mois)	P	Taux de pCR (%)	Taux de conservation mammaire (%)	RL (%)	SG (%)	DFS (%)
Mauriac ¹²⁰ (1991)	272	34	A	/	63 vs 0	8 vs 5	86 vs 72 NSS	62 vs 55
Scholl ¹²¹ (1994)	390	54	A+T	/	82 vs 77	NSS	86 vs 78	NSS
NSAPB-1 ^{8 115} (1998)	1493	108	A	13	67 vs 60	11 vs 8	70 vs 69	53 vs 55
Makris ¹¹⁸ (1998)	309	48	M	6	89 vs 78	3 vs 4	NSS	NSS
EORTC ¹¹⁷ (2001)	698	56	A	4	34 vs 23	10 vs 9 NSS	82 vs 84 NSS	65 vs 70 NSS

Notre expérience

- ✓ Janvier 2002 à avril 2013
- ✓ Carcinome mammaire infiltrant non inflammatoire sans métastase à distance
- ✓ 382 patientes

Critère principal de jugement

**Taux de conservation mammaire
69.4%**

- ✓ Réponse insuffisante = 60% des cas
 - ✓ Microcalcifications étendues = 13.8%
 - ✓ Localisations centrales = 23.4%
 - ✓ Souhait de la patiente = 4 cas

- ✓ 23 mastectomies de rattrapage = 6%

Prise en charge chirurgicale

Analyse univariée

- ✓ Stade T tumoral clinique +++++
- ✓ Histologie lobulaire
- ✓ Evaluation de la réponse clinique (C4 et C8)
- ✓ pCR

	Tout traitement chirurgical confondu (n= 382)	Mastectomie (n= 117)	Traitement conservateur (n= 265)
Age au diagnostic			
<40 ans	83 (21.7%)	20 (17.1%)	63 (23.8%)
40-50 ans	149 (39.0%)	50 (42.7%)	99 (37.4%)
>50 ans	150 (39.3%)	47 (40.2%)	103 (38.9%)
Histologie			
Lobulaire	36 (9.4%)	19 (16.2%)	17 (6.4%)
Canalaire	338 (88.5%)	95 (81.2%)	243 (91.7%)
Autres	8 (2.1%)	3 (2.6%)	5 (1.9%)
Grade SBR			
Non gradable	7 (1.9%)	2 (1.8%)	5 (1.9%)
I	8 (2.1%)	3 (2.7%)	5 (1.9%)
II	105 (28.0%)	45 (40.2%)	60 (22.8%)
III	255 (68.0%)	62 (55.4%)	193 (73.4%)
Données manquantes	7	5	2
Stade T Clinique			
T1/2	226 (59.6%)	41 (35.0%)	185 (70.6%)
T3/4	153 (40.4%)	76 (65.0%)	77 (29.4%)
Données manquantes	3	0	3

Analyse multivariée

	Odd Ratio	Intervalle de confiance à 95%	
Stade T Clinique			p
T1/2	3.59	[2.16; 5.96]	<0.001
T3/4	1		
Type histologique			p
Lobulaire	1		
Canalaire	1.63	[0.71; 2.20]	0.251
pCR			p
Non	1		
Oui	1.09	[0.64; 1.83]	0.761

Devenir

Recul 66,2 mois

62 évènements carcinologiques de progression

Traitement conservateur

Traitement radical

Discussion

- ✓ 94 mastectomies :
 - ✓ **Réponses insuffisantes** =
Critères de chimio sensibilité?
 - ✓ **Microcalcifications** étendues = indication?
 - ✓ **Localisations centrales** = PAMectomie
 - ✓ **Souhait**

- ✓ **Lésions multifocales?**

Discussion

Etude	Nbr	Suivi en mois	P	Taux de pCR (%)	Taux de conservation mammaire (%)	RL (%)	SG (%)	DFS (%)
Mauriac ¹²⁰ (1991)	272	34	A	/	63 vs 0	8 vs 5	86 vs 72	62 vs 55
Scholl ¹²¹ (1994)	390	54	A+T	/	61 vs 63	27 vs 19	86 vs 78	59 vs 55
NSAPB-1 ⁸ 115 (1998)	1493	108	A	13	60 vs 67	11 vs 8	70 vs 69	53 vs 55
Makris ¹¹⁸ (1998)	309	48	M	6	89 vs 78	3 vs 4	89 vs 78	/
EORTC ¹¹⁵ (2001)	698	48	A	4	22 vs 21	10 vs 9	82 vs 84	65 vs 70
Notre étude	382	66,2	A+T	40.1	69.4	2,4	89,92	82,48

Discussion

- ✓ Facteurs prédictifs du type de chirurgie :
 - ✓ Histologie lobulaire
 - ✓ souvent multicentrique
 - ✓ pCR faible 5%
 - ✓ Réponse meilleure si RH- et grade histologique 3 (pCR à 17,8%)
 - ✓ Stade T tumoral : pour des lésions inférieures à 5 cm, **3.59** fois plus de tumorectomies que de mastectomies

Discussion

✓ 10 années de notre activité et son **évolution**

Notre taux de conservation mammaire est une analyse sur 10 ans et est probablement sous estimé par rapport à la réalité de notre activité chirurgicale actuelle

Motivations
carcinologiques

Intention de conservation
du sein

**Chimiothérapie
néoadjuvante**

Protocole ICR
Évaluation clinique à chaque cycle
Évaluation écho à C4 et C8
Évaluation IRM à C8

Evaluation de la réponse
clinique et radiologique

Réponse complète

Réponse partielle

Absence de
réponse

Réponse fragmentée

Traitement
conservateur

Mastectomie ou
Tumorectomie +/-
oncoplastie

Mastectomie

Selon IRM:
Mastectomie ou
traitement
conservateur

Radiothérapie externe sein ou paroi +/- aires ganglionnaires

RCP

**Tentative de conservation?
Rapport Tt/Ts**

Oui

Cf. page 171

Non

Microcalcifications?
Multifocalité?

Oui

Cf. page 173

Non

Indication de
chimiothérapie en
adjuvant ?

Oui

Chimiothérapie néoadjuvante

Non

Cf. page 174

Evaluation clinique/radiologique

Réponse complète +/-
partielle

Traitement conservateur +/-
oncoplastie
Radiothérapie

Absence de réponse

Chimio
radiothérapie
néo adjuvante
et RMI

Mastectomie
Radiothérapie

Reconstruction
mammaire
secondaire

Mastectomie
+/- RMI en
absence de
Radiothérapie

Conclusion

- ✓ Arme efficace pour potentialiser la **conservation** du sein
- ✓ Aucun bénéfice de survie mais aucun effet délétère compromettant son utilisation
- ✓ **Bonne sélection** des patientes : *lésion unifocale aux caractéristiques biologiques présageant d'une bonne chimio sensibilité*

Merci de votre attention,